

CHLOROVÝ GRANULÁT.

Je vysoko účinný bezo zvyšku rýchlorozpuštný chlorový prípravok vo forme granulátu určený na prvotné zachľabovanie pri prvom (k každom novom) napuštění bazéna alebo virivky a na celosezónnu priebežnú dezinfekciu vody. Tento prípravok je možné použiť aj ako **CHLOR SOK** pri náhom aj veľmi slabo znečistení (zakalenie vody) alebo pri neočakávanom výskyte rias (zozelenanie vody). Výrazným zvýšením koncentrácie chloru spoľahlivo likviduje všetky druhy rias a baktérií.

Neodfarbuje plastové materiály a je vhodný aj pre fóliové bazény.

Biocidný výrobok určený na predaj spotrebiteľovi (TYP PT02).

Používajte biocidny bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

NAVOD NA POUŽITIE:

Pri práci s týmto prípravkom nefajčite, nejedzte a nepite. Používajte ochranné pomôcky (pracovný odev, rukavice a ochranné okuliare, príp. respirátor). Zabráňte úniku do životného prostredia. Vypúšťanie vody ošetrovej týmto prípravkom musí byť v súlade s kanalizačným poriadkom.

1. Pred použitím prípravku najprv skontrolujte hodnotu pH príslušným **testerom - Sparkly POOL**, upravte hodnotu pH vody v bazéne alebo virivke do rozmedzia 6,8 - 7,6 pomocou prípravkov **pH PLUS** alebo **pH MINUS** (napr. z radu **Sparkly POOL**).

2. Potrebno množstvo prípravku dokonale rozpustite v plastovej nádobe s vodou (o objeme 5 - 10 l) a rovnomerne aplikujte (rozlievajte) po celej hladine bazéna alebo ho pozvoľna nalievajte do vody v blízkosti skimmera vášho bazéna pri zapnutom filtračnom zariadení, aby došlo k dokonalému premiešaniu prípravku v bazéne. Filtračné zariadenie ponechajte v prevádzke aspoň po dobu 24 hodín (minimálna doba pôsobenia prípravku), v prípade aplikácie prvotnej alebo šokovej dezinfekcie, v prípade aplikácie na priebežnú dezinfekciu vody aspoň po dobu 3 hodín. Počas aplikácie prípravku a v nasledujúcich hodinách (podľa spôsobu použitia) nesmie byť nikto v bazéne prítomný, po rovnakú dobu zaistite účinné vetranie priestoru bazéna alebo virivky. Prípravok preto odporúčame aplikovať večer. **PRÍPRAVOK SA PRIDÁVA ZASADNE DO VODY, NIKDY NIE NAOPAK!**

3. Po dokončení minimálnej doby (pozri bod 2.) pôsobenia prípravku je nutné skontrolovať príslušným testerom:

A. Koncentráciu voľného chloru vo vode, ktorá musí byť v rozmedzí 0,3 - 0,6 mg/l (pri teplote vody nad 25 °C max. 0,8 mg/l). V prípade, že je koncentrácia voľného chloru vo vode vyššia ako uvedené hodnoty, nesmie byť v bazéne nikto prítomný a je nutné počkať na samovoľné zníženie koncentrácie alebo je možné použiť prípravok **CHLOR MINUS** (napr. z radu **Sparkly POOL**), ktorý koncentráciu zníži a umožní tak opätovné kúpanie vo veľmi krátkom čase.

B. Hodnotu pH vody v rozmedzí 6,8 - 7,6 (v prípade, že hodnotu pH často kolíše, odporúča sa použiť prípravok **ALKALITA PLUS** (napr. z radu **Sparkly POOL**), ktorý bráni náhlym zmenám hodnoty pH).

4. V prípade, že na ďalšiu priebežnú dezinfekciu používate tento prípravok, pokračujte aplikáciou podľa nižšie uvedeného dávkovania. Ak používate na ďalšiu priebežnú dezinfekciu chlorové tablety, je nutné ich pridať už v druhý deň po prvotnom alebo šokovom zachľabovaní. Možno použiť **CHLOROVÉ TABLETY** alebo **CHLOROVÉ TABLETY MULTIFUNKČNÉ** (z radu **Sparkly POOL**), ktoré sa vyznačujú svojou výsokou funkčnosťou a efektívnosťou.

NAŠ TIP:

Po použití tohto prípravku použite prípravok **VLOČKOVAČ, VLOČKOVAČ EXTRA** alebo **PREJASNOVAČ EXTRA** (z radu **Sparkly POOL**) a po dokončení minimálnej doby pôsobenia týchto prípravkov zvyšky nečistôt a zničených rias vysajte do odpadu mimo filtračného zariadenia. **Dosiahnete tak opätovne priaznivé a iskrivé vody vo vašom bazéne. Všetky vyššie uvedené (odporúčané) prípravky používajte podľa návodu uvedeného na ich obaloch!**

DAVKOVANIE:

1. Dávka na prvotnú a šokovú dezinfekciu: 25 g - max. 30 g na každý 1 m³ (1000 l) objemu vody v bazéne/virivke.

2. Dávka na priebežnú dezinfekciu: Aplikujte 1 g - 2 g (max. 3 g pri vyššej prevádzke v bazéne/virivke a vyššej teplote vody nad 25 °C) na každý 1 m³ (1000 l) objemu vody v bazéne/virivke každý deň tak, aby bola koncentrácia voľného chloru vo vode v rozmedzí 0,3 - 0,6 mg/l (pri teplote vody nad 25 °C max. 0,8 mg/l), v detských a malých bazénoch do 25 °C max. 0,3 mg/l.

SKLADOVANIE A DOBA SKLADOVATELNOSTI:

Spotrebujte do 24 mesiacov od dátumu balenia uvedeného na obale. Skladujte v originálnych, dobre uzavretých obaloch, na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste pri izbovej teplote. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní určeného spôsobu skladovania a používania nedochádza k rozkladu. Neskladujte spolu s nezhlučiteľnými (nekompatibilnými) materiálmi, potravinami, nápojmi a krmivami.

ČÍSLO SARZE: Uvedené na obale.



DODÁVATEL:
ProChem Solutions s.r.o.
9. května 832, 798 03 Plumlov
Česká republika
Kontakt pre Slovenskú republiku:
+421 2 2102 0707, info@sparklypool.sk

www.sparklypool.sk

UPOZORNENIE:

Pozor! Nemešajte a nepoužívajte spoločne s inými výrobkami. Nekompatibilné materiály: Oxidačné činidlá, redukčné činidlá, kyseliny, amoniak a jeho zlúčeniny, močovina, zásady, chlórnan vápenatý, organické rozpúšťadlá. Prípravok smie byť použitý iba na úpravu vody v bazénoch. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

OPIS OPATRENÍ PŘEVJ POMOCI:

PRÍ VDYCHNUTÍ:

Perušete expozíciu, dopravte postihnutého na čerstvý vzduch. Pri pretrvávajúcej nevoľnosti zaisťte lekársku pomoc.

PRÍ STYKU S POKOŽKOU:

Odstraňte kontaminovaný odev, topánky a zasiahnutú pokožku dôkladne umyte vodou (najlepšie vlažnou) a mydlom. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani niečidlá. Ak problém pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

PRÍ STYKU S OČAMI:

Vyplychujte miernym prúdom vody aspoň 15 minút. Držte pritom očné viečka doširoka otvorené pomocou palca a ukazováčika. V prípade, že postihnutý nosí kontaktné šošovky, vyberte ich pred vyplachovaním očí, ak to ide. Ak bolesť alebo sčervenanie pretrváva, vyhľadajte odborné lekárske oštenie.

PRÍ POŽITÍ:

Vyplychujte ústa a potom vypte veľké množstvo vody. Nevyplovaťajte zvracanie. Nepodávajte mlieko ani alkoholické nápoje. Osobám v bezvedomí nikdy nepodávajte nič utvára. Vyhľadajte lekársku pomoc.

LKVIDÁCIA:

Odstaráť podľa platných slovenských a miestnych predpisov (napr. v spaľovni nebezpečných odpadov). **Neodstraňujte zvyšky vhođením do kanalizácie.** Neznečistíte stojace alebo tečúcej vode chemikáliou alebo použitú nádobu. Zvyškové množstvo a nezregenerovateľné roztoky odovzdajte osvedčenej likvidáčnej firme. Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii alebo odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu. Za zariadenie odpadu a jeho zneškodnenie zodpovedá pôvodca odpadu.

ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI PRÍPRAVKU:

ÚČINNÁ LÁTKA, KONCENTRÁCIA:

Nátrium-triklosen, dihydrát, 99 g/100 g (EEC: 613-030-01-7, číslo CAS: 51580-96-0, číslo ES: 220-767-7).

VYŠTARŽENÉ SLOVO:

Pozor.

VYŠTARŽENÉ UPOZORNENIE:

Skodlivý po požití. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte **NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/MLÉKARA. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekárske pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej k likvidácii alebo odovzdaním na zberný dvor do časti nebezpečného odpadu. **Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn.**

PODROBNOSTI O POSKYTNUTÍ PŘEVJ POMOCI JE MOŽNÉ KONZULTOVAŤ S:

Národné toxikologické informačné centrum Bratislava, Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, telefón: + 421 2 5477 4166; mobil: +421 911 166 066 fax: + 421 2 5477 4605.

INFORMÁCIE O DOPRAVE:

UN číslo: 3077

REGISTRAČNÉ ČÍSLO SK: bio/4558/D/23/CCHLP

